

USO VETERINARIO  
SUSPENSIÓN INYECTABLE  
ANTIBACTERIANO



## FÓRMULA:

Cada mL de suspensión reconstituida contiene:

Penicilina G Benzatina	100,000 UI
Penicilina G Procaína	60,000 UI
Penicilina G Potásica	40,000 UI
Estreptomicina Base	160 mg
Diluyente:	
Dexametasona 21 fosfato	0.5 mg
Vehículo, c.b.p.	1.0 mL

## PRESENTACIÓN

<b>Frasco con:</b> 4 MUI	<b>Diluyente adjunto:</b> 20 ml.
-----------------------------	-------------------------------------

## ESPECIES:



## VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

**Intramuscular profunda**

## INDICACIONES:

Este producto está indicado en el tratamiento de enfermedades causadas por bacterias Gram (+) y Gram (-) susceptibles a los antibióticos de la fórmula. Además de la acción coadyuvante de la dexametasona como desinflamatorio.

## ADVERTENCIAS:

No utilizar este producto 30 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.  
No utilizar la leche para consumo humano de animales tratados, hasta 72 horas después de la última aplicación.  
El uso de ESTREPTODEX está contraindicado durante el último trimestre de gestación en bovinos y ovinos.  
Este medicamento es de uso exclusivo en medicina veterinaria.  
Almacenar en lugar fresco y seco al resguardo de la luz solar.  
Manténgase fuera del alcance de los niños.

## DOSIS:

Mézclese perfectamente con el diluyente que se acompaña.  
En Bovinos (productores de carne y leche), Porcinos, Ovinos, Caprinos, Caninos y Felinos: Aplíquese de 11,000 a 22,000 UI por kg de peso vivo, lo que equivale a administrar 1 mL/10-20 kg de peso vivo. Cada 12 a 24 hrs, por 3 a 5 días consecutivos, de acuerdo a la severidad del caso o a juicio del Médico Veterinario.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA