

 **FÓRMULA:**

**Cada frasco contiene:**

Penicilina G Benzatina	2,000 000 UI
Penicilina G Procaína	1,200 000 UI
Penicilina G Potásica	800,000 UI
Kanamicina Base	1.430 g.
Dihidroestreptomicina Base	1.600 g.
Estreptomicina Base	1.600 g.
Diluyente	20.0 mL.

**PRESENTACIÓN**

<b>Frasco con:</b> 4 MUI	<b>Diluyente adjunto:</b> 20 mL
-----------------------------	------------------------------------

 **ESPECIES:**



 **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

**Intramuscular**

 **INDICACIONES:**

Úsese en aquellos padecimientos originados por las bacterias susceptibles a los antibióticos de la fórmula como en Neumonías, abscesos, heridas infectadas, preventivo en castraciones, en Bovinos de engorda, Ovinos, Caprinos y Porcinos.

 **ADVERTENCIAS:**

No deberá usarse este producto 60 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Almacenar en lugar fresco y seco al resguardo de la luz solar. Una vez reconstituido manténgase en refrigeración. Este medicamento es de uso exclusivo en medicina veterinaria. No administrar en hembras en producción de leche para consumo humano.

 **DOSIS:**

Mézclase perfectamente con el diluyente que se acompaña. Aplíquese de 11,000 a 22,000 U.I. por kg de peso vivo, lo que equivale a administrar 1 ml por cada 10 a 20 kg de peso vivo. Cada 12 a 24 horas, por 3 a 5 días consecutivos, de acuerdo a la severidad del caso o al juicio del Médico Veterinario.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA