



HAXCEL MBD

Número de Registro Q-5918-064

USO VETERINARIO

ANTIBIÓTICO

CEFTIOFUR HCl

SUSPENSIÓN OLEOSA INYECTABLE



FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Ceftiofur HCl
Vehículo c.b.p.

50.0 mg.
1.0 mL.

PRESENTACIÓN:

100 mL.



ESPECIES:



BOVINOS, PORCINOS, CANINOS Y FELINOS.



INDICACIONES:

HAXCEL MBD, Para el tratamiento de enfermedades respiratorias causadas por patógenos sensibles al antibiótico de la fórmula como: *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Salmonella choleraesuis*, *Streptococcus suis* tipo 2, *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *Histophilus somni* y también se recomienda en pododermatitis ocasionada por *Fusobacterium necrophorum* y *Bacteroides melanogenicus*.



DOSIS:

Porcinos: 1 ml de HAXCEL MBD por cada 10 a 16.6 kg de peso vivo, lo que equivale a administrar, 3 - 5 mg de Ceftiofur HCl/kg /24 hrs/3 días.

Bovinos: 1 ml de HAXCEL MBD por cada 22.7 a 45.4 kg de peso vivo, lo que equivale a administrar 1.1 - 2.2 mg de Ceftiofur HCl /kg /24 hrs/3 días.

Caninos y Felinos: 1 ml HAXCEL MBD por cada 11.36 a 22.72 kg de peso vivo, lo que equivale a administrar, 2.2 a 4.4 mg de Ceftiofur HCl /kg /24 hrs/5 días.



VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Porcinos: Intramuscular.

Bovinos: Intramuscular y Subcutánea.

Caninos y Felinos: Subcutánea.



ADVERTENCIAS:

Tiempo de retiro en leche 0 días.

No consumir la carne para consumo humano, hasta pasados 3 días en Bovinos y 4 días en Porcinos. Puede causar reacciones alérgicas en individuos sensibles al medicamento.

Agítese bien antes de usarse.

Consumir el contenido en el transcurso de 14 días después de abierto.

Consérvese el producto en lugar fresco y seco, al resguardo de la luz solar.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

quimicafarvet.com.mx

Hecho en México por:
QUIMICA FARVET, S.A. de C.V.

Tels: (352) 526-4440

QuimicaFarvet.mx

QuimicaFarvet.MX

@quimicafarvet9266