



IVERGOLD LP 4%®

Número de Registro Q-5918-102

USO VETERINARIO

SOLUCIÓN INYECTABLE DE LIBERACIÓN PROLONGADA

ENDECTOCIDA

PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO DE PARÁSITOS INTERNOS Y EXTERNOS



FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

Ivermectina
Vehículo, c.b.p.

4.0 g.
100.0 mL

PRESENTACIÓN: 500 mL.



ESPECIES:
BOVINOS



(PRODUCTORES DE CARNE)



INDICACIONES:

IVERGOLD LP 4%, está indicado para el control y tratamiento de gusanos redondos (gastrointestinales y pulmonares), así como de ectoparásitos: moscas, piojos y ácaros de la sarna. Está indicado en la prevención de gusaneras del ombligo de los becerros recién nacidos y de las heridas por castración.

Se indica además para el control de diversos parásitos internos y externos, como: Parásitos gastrointestinales (formas adultas y cuarto estadio larvario) incluyendo: *Ostertaria ostertari* (incluso formas inhibidas), *O. lyrata*, *Haemonchus contortus*, *H. placei*, *Trichostrongylus axei*, *Cooperia pectinata*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Bonustomum phlebotomum*.

Parásitos pulmonares: *Dictycaulus viviparus*.

Control y tratamiento de ectoparásitos: Moscas: Estado larvario de *Dermatobia hominis*, *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum* y moscas chupadoras como *Stomoxys calcitrans* y *Haematobia irritans*.

Piojos: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Selenopotes copillatus*, *Damalina bovis*.

Ácaros de la sarna: *Psoroptes communis var bovis*, *Sarcoptes scabiei var bovis*, *Chorioptes bovis*.

Garrapatas: *Boophilus microplus*.



DOSIS:

Bovinos: 1 mL por cada 50 kg de peso vivo, lo que equivale a administrar 0.80 mg de Ivermectina / kg de peso vivo. No exceder cantidades mayores a 10 mL en la misma zona de aplicación.



VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía **Subcutánea** exclusivamente, en el área de la escápula (paleta) o en la tabla del cuello



ADVERTENCIAS:

Los animales cuya carne se destine a consumo humano, sólo podrán ser sacrificados después de 122 días de la fecha de tratamiento.

No usar en vacas en lactación cuya leche se destine para consumo humano.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase alejado de alimentos y bebidas.

No debe administrarse por vía intravenosa ni intramuscular.

Lávese las manos después de manipular el producto.

Manténgase en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar.

Los organismos acuáticos son altamente sensibles a la toxicidad de la Ivermectina, por lo cual los recipientes vacíos y cualquier contenido residual deben ser desechados en forma segura, enterrándolos o incinerándolos.

quimicafarvet.com.mx

Hecho en México por:

QUIMICA FARVET, S.A. de C.V.

Tels: (352) 526-4440 y (352) 526-1502

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA