



MEGLUVET

Número de Registro Q-5918-112

USO VETERINARIO
SOLUCIÓN INYECTABLE
ANALGÉSICO ANTIPIRÉTICO Y
ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDAL.



FÓRMULA:

Cada mL contienen:

Flunixin de meglumina 83 mg.
(Equivalente a 50 mg de Flunixin base)
Vehículo c.b.p. 1 mL

INDICACIONES:

MEGLUVET, está indicado como antiinflamatorio, analgésico y antipirético no esteroide, asociado a padecimientos respiratorios, septicemias, mastitis, metritis, cólico, alteraciones del músculo esquelético.

PRESENTACIÓN: 5, 10, 20, 50, 100, 250 Y 500 mL.

ESPECIES:



DOSIS:

Bovinos (productores de carne y leche): 1 a 2 mL por cada 45 kg de peso corporal (equivalente a 1.1 a 2.2 mg de flunixin base por kg de p.v.) cada 12 horas no más de 3 días por vía intravenosa.

Ovinos, Caprinos y Porcinos: 2 mL por cada 45 kg de peso (equivalente a 2.2 mg de flunixin base por kg de p.v.) cada 24 horas, por vía intramuscular.

Equinos: 1 a 2 mL por cada 45 kg de peso corporal (equivalente a 1.1 a 2.2 mg de flunixin base por kg de p.v.) cada 24 horas durante no más de 5 días, por vía intramuscular o intravenosa.

Caninos y felinos: 1 mL por cada 45 kg de peso corporal (equivalente a 1.1 mg/kg de flunixin base por kg de p.v.) por vía intramuscular o intravenosa.

La modificación en la dosis queda a criterio del médico veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular o Intravenosa.

ADVERTENCIAS:

No consumir la leche de vacas tratadas durante las 36 horas posteriores a la última aplicación.

No usar en bovinos 4 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

No consumir la carne de Ovinos y Cabras tratadas con este producto hasta pasados 4 días del último tratamiento, ni la leche hasta pasadas 36 horas posteriores a la última aplicación.

En cerdos no usar este producto 21 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

Evite la aplicación intraarterial.

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños.

Este producto es de uso exclusivo en medicina veterinaria.

Cuando se aplique utilice material estéril.

Manténgase este producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.

Consérvese entre 2 y 30°C

No se administre a equinos destinados al consumo humano.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

Hecho en México por:
QUIMICA FARVET, S.A. de C.V.

Tels: (352) 526-4440 y (352) 526-1502

quimicafarvet.com.mx

[QuimicaFarvet.mx](https://www.facebook.com/QuimicaFarvet.mx)

[QuimicaFarvet.MX](https://www.instagram.com/QuimicaFarvet.MX)

[@quimicafarvet9266](https://www.youtube.com/@quimicafarvet9266)