

USO VETERINARIO

ANTIBIÓTICO, PENICILINA G PROCAÍNA  
SUSPENSIÓN INYECTABLE



**FÓRMULA:**

Cada mL contiene:

Penicilina G. Procaína 300,000 U.I.  
Vehículo c.b.p. 1.0 mL.

**PRESENTACIÓN**

100, 250 y 500 ml.



**ESPECIES:**



**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Intramuscular profunda



**INDICACIONES:**

Para el tratamiento de enfermedades en bovinos y porcinos causadas por bacterias patógenos gram (+) sensibles a la penicilina.



**ADVERTENCIAS:**

Agítese bien antes de usarse.

Consérvese el producto en un lugar fresco y seco, al resguardo de la luz.

Para tiempo prolongado de almacenaje, consérvese entre 2 y 8 °C.

Puede causar reacciones alérgicas en individuos sensibles al medicamento.

En caso de reacción alérgica considere la aplicación de antihistamínicos.

No se consuma la leche de animales tratados hasta 7 días después del último tratamiento.

El tiempo de retiro en carne de Bovinos y Cerdos es de 15 días.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Uso exclusivo en medicina veterinaria.



**DOSIS:**

**Bovinos (productores de carne y leche):** Bovinos (productores de carne y leche): 7 mL por cada 100 kg de peso corporal, lo que equivale a administrar 21,000 UI/Kg de peso vivo cada 12 o 24 hrs, durante 4-6 días.

**Cerdos:** 1 mL por cada 15 kg de peso vivo, lo que equivale a administrar 20,000 UI/Kg de peso vivo cada 12 o 24 hrs. durante 4-6 días.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA