

USO VETERINARIO
SOLUCIÓN INYECTABLE
ANTIBACTERIANO



FÓRMULA:

Cada ml contiene:

Gentamicina Base	100.0 mg.
(Como sulfato de Gentamicina)	
Vehículo, c.b.p.	1.0 mL.

PRESENTACIÓN

20, 100 y 250 ml.

ESPECIES:



VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular, subcutánea

INDICACIONES:

Bovinos: Mastitis, Neumonías, Septicemia, Metritis y Endometritis.

Porcinos: Colibacilosis neonatal, Disentería Porcina, Salmonelosis, Estreptocócicas y Estafilocócicas, Mycoplasmosis.

Aves: *E. coli*, *E. aerogenes*, *Salmonella* y *P. aeruginosa*.

ADVERTENCIAS:

No usar este producto en ganado bovino de carne 21 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

No usar este producto en ganado porcino 40 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

No usar este producto en pollos 35 días y pavos 63 días, antes del sacrificio de los animales para consumo humano.

No utilizar para consumo la leche procedente de vacas tratadas con este producto, hasta pasados 4 días después de la última aplicación.

No utilizar para consumo la leche procedente de cabras tratadas con este producto, hasta pasados 7 días después de la última aplicación.

Este medicamento es de uso exclusivo en medicina veterinaria.

Almacenar en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar directa.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

No utilizar en Equinos destinados para consumo humano.

DOSIS:

Bovinos (de carne y leche), Equinos, Porcinos, Caprinos, Caninos y Felinos: 5 mg de gentamicina por kg de peso vivo, lo que equivale a administrar 1 mL por cada 20 kg de peso vivo. Administrar cada 12 a 24 horas por un periodo de 3 a 5 días dependiendo de la severidad del caso.

Aves: En pollito de un día de edad; 0.2 mg de gentamicina, se recomienda diluir 4 mL de QUIMIGEN-100 en 396 ml de solución salina estéril, mezclar hasta homogenizar y aplicar dosis única, por vía subcutánea, en la parte posterior del cuello a razón de 0.2 mL por pollito.

En **pavos** de 1 a 3 días de edad; 0.1 mg de gentamicina, se recomienda diluir 2 mL de QUIMIGEN 100 en 398 mL de solución salina estéril, mezclar hasta homogenizar y aplicar dosis única, por vía subcutánea en la parte posterior del cuello a razón de 0.1 mL por pavo.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA