



SILVERMEC®

Número de Registro Q-5918-053

USO VETERINARIO

ANTIPARASITARIO ENDECTOCIDA.

PARA EL TRATAMIENTO DE NEMATODOS

Y ECTOPARÁSITOS.

SOLUCIÓN INYECTABLE.

PRESENTACIÓN: 10, 50, 100, 250 y 500 mL.



FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

Ivermectina
Vehículo c.b.p.

1.0 g.
100.0 ml.



ESPECIES:



BOVINOS (productores de carne), PORCINOS, CAPRINOS, CANINOS Y FELINOS.



INDICACIONES:

SILVERMEC®, Para el tratamiento de parasitosis de estados larvarios y adultos de los nematodos internos hasta por 28 días y ectoparásitos como ácaros de la sarna y piojos.



DOSIS:

Bovinos (productores de carne) y Ovinos: 1 ml / 50 kg peso vivo (10 mg / 50 kg equivalente a 200 mcg / kg). Dosis única.

Porcinos: 1 ml / 33 kg de peso vivo (10 mg / 33 kg equivalente a 303 mcg / kg). Dosis única.

Caninos y Felinos: 0.2 ml / 10 kg de peso vivo (2 mg / 10 kg equivalente a 200 mcg / kg) ó 0.08 ml / 2 kg de peso vivo (0.8 mg / 2 kg equivalente a 400 mcg / kg).

Endoparásitos:

Nematodos gastrointestinales, en dosis única.

Ectoparásitos: *Sarna sarcóptica: Sarcoptes scabiei var. Canis:* Aplicar 200-400 mcg de ivermectina por Kg de peso vivo, tres aplicaciones con un intervalo de 7 a 10 días.

Sarna otodéctica: Otodectes cynotis: Aplicar 200-400 mcg de ivermectina por Kg de peso vivo, una aplicación repetir a los 15 días.

Cheyletiellosis: Cheyletiella biakel y Cheyletiella yasguri: aplicar 300 mcg de ivermectina por Kg de pesos vivo, 3 veces con un intervalo de aplicación de 2 semanas.

Sarna demodéctica canina: Demodex canis: aplicar 400 mcg por Kg de peso corporal via SC con intervalo de 8 días; 8 aplicaciones en total.

Sarna notoédrica: Notoedres cati: Aplicar 200 - 400 mcg de ivermectina por Kg de peso vivo, una aplicación y repetir a los 15 días.



VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Subcutánea exclusivamente



ADVERTENCIAS:

No usar 28 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

Guárdese en lugar fresco y protegido de la luz.

Los organismos acuáticos son altamente sensibles a la toxicidad de la ivermectina por lo que los envases y sus residuos deberán desecharse en forma segura incinerándolos o enterrándolos.

No utilizar este producto en ganado lechero en producción.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Prohibido el uso de este producto en el control de la garrapata *Rhipicephalus spp.*

No se administre este producto a perros de razas susceptibles a la Ivermectina, como son Collie, Shetland, Ovejero inglés, Pastor Escocés, Samoyedo, Husky siberiano, Galgos Afganos y Borzoi.

No utilizar en gatos menores de 4 meses de edad.

Ver el instructivo anexo.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

quimicafarvet.com.mx

Hecho en México por:

QUIMICA FARVET, S.A. de C.V.

Tels: (352) 526-4440 y (352) 526-1502

QuimicaFarvet.mx

QuimicaFarvet.MX

@quimicafarvet9266