



FÓRMULA:

Cada 1000 g contienen:

Sulfaclopiridacina	100.0 g.
Trimetoprim	20.0 g.
Oxitetraciclina HCl equivalente a	
Oxitetraciclina base	200.0 g.
Cloruro de sodio	250.0 g.
Excipiente c.b.p.	1000 g.

PRESENTACIÓN

10 y 25 kg

ESPECIES:



VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

INDICACIONES:

Metafiláctico y tratamiento de infecciones respiratorias causadas por *Pasteurella spp*, *Haemophilus spp*, *Streptococcus*, *Staphylococcus* y *Corynebacterium*; y diarreas bacterianas causadas por *Salmonella* y *Escherichia coli* en porcinos.

ADVERTENCIAS:

El tratamiento deberá suspenderse 10 días antes del sacrificio de animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Almacenar en un lugar fresco y seco al resguardo de la luz solar.

DOSIS:

Metafiláctica: Agregar 1 kg por tonelada de alimento lo que equivale a administrar 100 ppm de Sulfaclopiridacina, 20 ppm de Trimetoprim y 200 ppm de Oxitetraciclina HCl, durante 20 días.

Tratamiento: Agregar 2 kg por tonelada de alimento lo que equivale a administrar 200 ppm de Sulfaclopiridacina, 40 ppm de Trimetoprim y 400 ppm de Oxitetraciclina HCl, durante 10 días.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA