



# TRIMEXOL S-20

Número de Registro Q-5918-111

USO VETERINARIO  
SOLUCIÓN INYECTABLE.  
ANTIBACTERIANO QUIMIOTERÁPICO.



#### FÓRMULA:

**Cada 100 mL contienen:**

Sulfametoxazol	20.0 g
Trimetoprim	4.0 g
Vehículo, c.b.p.	100.0 mL

**PRESENTACIÓN:** 5, 10, 20, 30, 50, 100, 250 y 500 mL



#### ESPECIES:



Equinos, bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos, felinos, aves.



#### INDICACIONES:

**TRIMEXOL S-20**, es un antimicrobiano quimioterápico bactericida de amplio espectro que se indica para el tratamiento de enfermedades infecciosas producidas por bacterias Gram positivas tales como especies susceptibles de los géneros: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Nocardia spp., y Gram negativas como: Pasteurella spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus spp., Bordetella bronchiseptica, Klebsiella spp., Moraxella spp., Brucella spp., Vibrio spp., Leptospira spp., Fusobacterium necrophorum, Salmonella spp., Escherichia coli, Proteus spp., Shigella spp., Campylobacter spp., Así como en contra de ciertos protozoos como Coccidios (Eimeria spp., Isospora spp) y Toxoplasmas.



#### DOSIS:

En Bovinos (productores de carne y leche) y Equinos: 1 ml por cada 15 kg de peso vivo. Equivalente a administrar 16 mg de peso vivo.

Porcinos, Ovinos y Caprinos: 1 ml por cada 8 kg de peso vivo. Equivalente a administrar 30 mg/kg de peso vivo.

Cada 24 a 48 horas dependiendo de la severidad del caso, por un periodo de hasta 5 días.

Caninos y Felinos: 1 mL por cada 16 kg de peso vivo. Equivalente a administrar 15 -30 mg por kg de peso vivo, cada 24 horas.

Aves: Diluir 70 mL de TRIMEXOL S-20 en 100 mL de solución salina fisiológica. De esta dilución, debe aplicar 0.2 mL por cada kg de peso vivo.

Caninos y Felinos:



#### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

**Intramuscular o subcutánea.**

**En equinos intravenosa lenta.**



#### ADVERTENCIAS:

No usar este producto 14 días antes del sacrificio de los animales para consumo humano.

No utilizar para consumo humano la leche procedente de animales tratados con este producto hasta 4 días después de la última aplicación.

No usar el huevo de aves ponedoras hasta pasados 10-14 días después de la última aplicación.

No administrar este producto en equinos para consumo humano.

Consérvese en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar directa.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

quimicafarvet.com.mx

Hecho en México por:

**QUIMICA FARVET, S.A. de C.V.**

Tels: (352) 526-4440 y (352) 526-1502

QuimicaFarvet.mx

QuimicaFarvet.MX

@quimicafarvet9266